

الفرعونية للأدوية

فارو فارما

ش.م.م منشأة طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢٥٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر ١٠٠ مليون جنيه مصري



www.pharoniapharma.com

Detronin Tablets

Qualitative and quantitative composition:

Each tablet contains:

Active ingredient:

Oxybutynin chloride 5 mg

Inactive ingredients:

Lactose monohydrate, Maize starch, Croscarmellose sodium, Colloidal silicon dioxide, Magnesium stearate.

Pharmaceutical form:

Detronin oral tablet

Therapeutic indications:

Urinary incontinence, urgency and frequency in the unstable bladder, whether due to neurogenic bladder disorders (detrusor hyper-reflexia) in conditions such as multiple sclerosis and spina bifida, or to idiopathic detrusor instability (motor urge incontinence).

Paediatric population

Oxybutynin chloride is indicated in children over 5 years of age for:

- Urinary incontinence, urgency and frequency in unstable bladder conditions due to idiopathic overactive bladder or neurogenic bladder disorders (detrusor over activity).
- Nocturnal enuresis associated with detrusor over activity, in conjunction with non-drug therapy, when other treatment has failed.

Dosage and administration:

Adults: The usual dose is 5mg two or three times a day. This may be increased to a maximum of 5 mg four times a day to obtain a clinical response provided that the side effects are tolerated.

Elderly (including frail elderly): The elimination half-life is increased in the elderly. Therefore, a dose of 2.5mg twice a day, particularly if the patient is frail, is likely to be adequate. This dose may be titrated upwards to 5mg two times a day to obtain a clinical response provided the side effects are well tolerated.

Children (under 5 years of age): Not recommended

Children (over 5 years of age): Neurogenic bladder instability: the usual dose is 2.5mg twice a day. This dose may be titrated upwards to 5mg two or three times a day to obtain a clinical response provided the side effects are well tolerated. Nocturnal enuresis: the usual dose is 2.5mg twice a day. This dose may be titrated upwards to 5mg two or three times a day to obtain a clinical response provided the side effects are tolerated. The last dose should be given before bedtime.

Contraindications:

Hypersensitivity to oxybutynin or any component.

Myasthenia gravis.

Narrow-angle glaucoma or shallow anterior chamber.

Gastrointestinal obstructive disorders including paralytic ileus, intestinal atony.

Patients with toxic megacolon.

Patients with severe ulcerative colitis.

Patients with bladder outflow obstruction where urinary retention may be precipitated.



1/5

الإدارة والمصنع : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك ١٦ قطعة رقم (١)

تليفون : ٤٩٠٨٣٦٧ / ٥ / ٦ / ٧ / ٨ / ٩ / ١٠ فاكس : ٤٥٩٨٣٦٧ (٠٣)

Administration & Factory : New Borg El-Arab City - Third Industrial Zone - Block 16 - Part (1)

ص.ب : ٤٩٠٨٣٦٧ - برج العرب الجديدة - س.ت. رقم : ١٣٤٣٠٠ - إسكندرية - ب.ض : ٢٠٢-٤٦٤-٦٣٦ مركز كبار المولين

مكتب القاهرة : ٤ (ي) تقسيم أسماء فهمي - أرض الجولف - مدينة نصر - عمارة فارما بلازا - شقة ٢١ / ٢٢

تليفون : ٤٩٠٨٣٦٧ / ٥ / ٦ / ٧ / ٨ / ٩ / ١٠ فاكس : ٢٤١٥٥٩٦١ (٠٢)



الفرعونية للأدوية

فارو فارما

ش.م.م منشأة طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢٥٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر ١٠٠ مليون جنيه مصري



PHARO
PHARMA

www.pharoniapharma.com

Special warnings and precautions for use:

- Oxybutynin should be used with caution in the frail elderly, patients with Parkinson's disease and children who are at greater risk of occurrence of adverse reactions to the product, and in patients with autonomic neuropathy (such as those with Parkinson's disease), severe gastro-intestinal motility disorders, hepatic or renal impairment.
- Anticholinergics should be used with caution in elderly patients due to the risk of cognitive impairment.
- Gastrointestinal disorders: Anticholinergic medicinal products may decrease gastrointestinal motility and should be used with caution in patients with gastrointestinal obstructive disorders, intestinal atony and ulcerative colitis.
- Oxybutynin may aggravate tachycardia (and thus be cautious in case of hyperthyroidism, congestive heart failure, cardiac arrhythmia, coronary heart disease, hypertension), cognitive disorders and symptoms of prostatic hypertrophy.
- Anticholinergic CNS effects (e.g. hallucinations, agitation, confusion, somnolence) have been reported; monitoring recommended especially in first few months after initiating therapy or increasing the dose; consider discontinuing therapy or reducing the dose if anticholinergic CNS effects develop.
- Since oxybutynin can cause narrow-angle glaucoma, patients should be advised to contact a physician immediately if they are aware of a sudden loss of visual acuity or ocular pain.
- Oxybutynin may reduce salivary secretions which could result in dental caries, parodontosis or oral candidiasis.
- Anticholinergic medicinal products should be used with caution in patients who have hiatus hernia/gastro-oesophageal reflux and/or who are concurrently taking medicinal products (such as bisphosphonates) that can cause or exacerbate oesophagitis.
- When oxybutynin is used in high environmental temperatures, this can cause heat prostration due to decreased sweating.
- If you have been told by your doctor that you cannot tolerate or digest some sugars (have an intolerance to some sugars), talk to your doctor before taking this medicine.

Paediatric population

The use of oxybutynin in children under 5 years of age is not recommended; it has not been established whether oxybutynin can be safely used in this age group.

There is limited evidence supporting the use of Oxybutynin in children with monosymptomatic nocturnal enuresis (not related to detrusor overactivity):

In children over 5 years of age, Oxybutynin hydrochloride should be used with caution as they may be more sensitive to the effects of the product, particularly the CNS and psychiatric adverse reactions.

Interaction with other medicinal products and other forms of interaction:

Care should be taken if other anticholinergic agents are administered together with Ditropan, as potentiation of anticholinergic effects could occur.

The anticholinergic activity of oxybutynin is increased by concurrent use of other anticholinergics or medicinal products with anticholinergic activity, such as amantadine and other anticholinergic antiparkinsonian medicinal products (e.g. biperiden, levodopa), antihistamines, antipsychotics (e.g. phenothiazines, butyrophenones, clozapine), quinidine, digitalis, tricyclic antidepressants, atropine and related compounds like atropinic antispasmodics and dipyridamole.

Patients with rare hereditary problems of galactose intolerance, the lactase deficiency or glucose-galactose malabsorption shouldn't take this medicine. Azcar



PHARO
PHARMA





By reducing gastric motility, oxybutynin may affect the absorption of other drugs. Oxybutynin is metabolised by cytochrome P 450 isoenzyme CYP 3A4. Concomitant administration with a CYP3A4 inhibitor can inhibit oxybutynin metabolism and increase oxybutynin exposure. Oxybutynin, as an anticholinergic agent, may antagonize the effect of prokinetic therapies. Concomitant use with cholinesterase inhibitors may result in reduced cholinesterase inhibitor efficacy. Patients should be informed that alcohol may enhance the drowsiness caused by anticholinergic agents such as oxybutynin.

Pregnancy and lactation

- Pregnancy: there are no adequate data from the use of oxybutynin in pregnant women. Animal studies are insufficient with respect to effects on pregnancy, embryonal/foetal development, parturition or postnatal development. The potential risk for humans is unknown. Oxybutynin should not be used during pregnancy unless clearly necessary.
- Lactation: when oxybutynin is used during lactation, a small amount is excreted in mother's milk. Use of oxybutynin during breast feeding is therefore not recommended.

Effects on ability to drive and use machines:

Oxybutynin may cause drowsiness or blurred vision. Patients should be cautioned regarding activities requiring mental alertness such as driving, operating machinery or performing hazardous work while taking this drug.

Undesirable effects:

Classification of expected frequencies:

Very common ($\geq 1/10$); common ($\geq 1/100$ to $< 1/10$); uncommon ($\geq 1/1,000$ to $< 1/100$); rare ($\geq 1/10,000$ to $< 1/1,000$); very rare ($< 1/10,000$), not known (cannot be estimated from the available data).

• Infections and infestations

Not known: urinary tract infection

• Gastro-intestinal disorders

Very common: constipation, nausea, dry mouth

Common: diarrhoea, vomiting

Uncommon: abdominal discomfort, anorexia, decreased appetite, dysphagia

Not known: gastroesophageal reflux disease, pseudo-obstruction in patients at risk (elderly or patients with constipation and treated with other drugs that decrease intestinal motility)

• Psychiatric disorders

Common: confusional state

Not known: agitation, anxiety, hallucinations, nightmares, paranoia, cognitive disorders in elderly, symptoms of depression, dependence to oxybutynin (in patients with history of drug or substance abuse)

• Nervous system disorders

Very common: dizziness, headache, somnolence

Not known: cognitive disorders, convulsions, drowsiness, disorientation

• Cardiac disorders

Not known: tachycardia, arrhythmia

• Injury, poisoning and procedural complications

Not known: heat stroke



الفرعونية للأدوية

فارو فارما

ش.م.م منشأة طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢٥٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر ١٠٠ مليون جنيه مصري



www.pharoniapharma.com

• Eye disorders

Very common: vision blurred

Common: dry eyes

Not known: Angle closure glaucoma, mydriasis, ocular hypertension

• Renal and urinary disorders

Common: urinary retention

Not known: difficulty in micturition

• Vascular disorders

Common: flushing which may be more marked in children

• Skin and subcutaneous tissue disorders

Very common: dry skin

Not known: angioedema, rash, urticaria, hypohidrosis, photosensitivity

• Immune system disorders

Not known: hypersensitivity.

Overdose:

The symptoms of overdosage with oxybutynin progress from an intensification of the usual side effects of CNS disturbances (from restlessness and excitement to psychotic behaviour), circulatory changes (flushing, fall in blood pressure, circulatory failure etc), respiratory failure, paralysis and coma.

Measures to be taken are:

1) immediate gastric lavage

2) physostigmine by slow intravenous injection

Adults: 0.5 to 2.0 mg of physostigmine by slow intravenous administration. Repeat after 5 minutes, if necessary up to a maximum total dose of 5mg.

Children: 30 micrograms/kg of physostigmine by slow intravenous administration. Repeat after 5 minutes, if necessary up to a maximum total dose of 2mg.

Fever should be treated symptomatically with tepid sponging or ice packs.

In pronounced restlessness or excitation, diazepam 10mg may be given by intravenous injection, tachycardia may be treated by intravenous injection of propranolol and urinary retention can be managed by bladder catheterisation.

In the event of progression of the curare- like effect to the paralysis of the respiratory muscles, mechanical ventilation will be required.

Pharmacodynamic properties:

Oxybutynin has both direct antispasmodic action on the smooth muscle of the bladder detrusor muscle as well as an anticholinergic action in blocking the muscarinic effects of acetylcholine on smooth muscle. These properties cause relaxation of the detrusor muscle of the bladder in patients with an unstable bladder. Ditropan increases bladder capacity and reduces the incidence of spontaneous contractions of the detrusor muscle.

Pharmacokinetic properties:

Oxybutynin is poorly absorbed from the gastrointestinal tract. It is highly bound to plasma proteins. the peak plasma level is reached between 0.5 to 1 hour after administration. The half life is biexponential, the first phase being about 40 minutes and the second about 2-3 hours. The elimination half life may be increased in the elderly, particularly if they are frail.



الفرعونية للأدوية

فارو فارما

ش.م.م منشأة طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢٥٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر ١٠٠ مليون جنيه مصري



www.pharoniapharma.com

Oxybutynin and its metabolites are excreted in the faeces and urine. There is no evidence of accumulation.

Special precautions for storage:

Keep at a temperature not exceeding 30°C in dry place.

Keep out of reach of children

Nature and contents of container

Carton box containing *transparent (Al + transparent PVC)* strip of 10 tablets + insert pamphlet.

Manufacturer:

Pharaonia Pharmaceuticals (Pharo Pharma)

New Borg El Arab city – 3rd Industrial zone – block no. 16 – Alexandria – Egypt



الإدارة و المصنع : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك ١٦ قطعة رقم (١)

تليفون : ٤٦٢٢٢٠٢ / ٣ / ٤ / ٥ / ٦ / ٧ / ٨ : فاكس : ٥٩٨٣٦٧ (٠٣)

Administration & Factory : New Borg El-Arab City - Third Industrial Zone - Block 16 - Part (1)

ص.ب : ٤٩ - برج العرب الجديدة - س.ت رقم : ١٣٤٣٠٠ - إسكندرية - ب.ض : ٢٠٢-٤٦٤-٦٣٦ مركز كبار المولين

مكتب القاهرة : ٤ (ي) تقسيم أسماء فهمى - أرض الجولف - مدينة نصر - عمارة فارما بلازا - شقة ٢١ / ٢٢

تليفون : ٢٦٩٠٧٣٩٤ / ٥ / ٦ : فاكس : ٢٤١٥٥٨٩٣ (٠٢) فاكس : ٢٤١٥٥٩٦١ (٠٢)



الفرعونية للأدوية

فاروفارما

ش.م.م منشأة طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢٥٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر ١٠٠ مليون جنيه مصري



www.pharoniapharma.com

ديترونيين أقراص

يجب قراءة النشرة جيداً قبل البدء في تناول هذا الدواء.
- ينصح بالاحتفاظ بهذه النشرة لأن المريض قد يحتاج أن يقرأها مرة أخرى.
- لو أن المريض لديه أسئلة أخرى فعليه الرجوع للطبيب أو الصيدلي.
- إذا وصف هذا الدواء لمريض، فلا يجب أن يصفه لشخص آخر. قد يتسبب في أضراره حتى أن كان هذا الشخص يعاني من نفس الأعراض.
- لو لاحظ المريض أي أعراض جانبية بما في ذلك أي أعراض جانبية محتملة لم تذكر في هذه النشرة فعليه الرجوع للطبيب أو الصيدلي فوراً.

١- ما هو ديترونيين وكيف يعمل هذا الدواء و فيم يستخدم ؟

* ما هو مستحضر ديترونيين أقراص؟
ديترونيين أقراص هو دواء يحتوي على المادة الفعالة: أوكسيبيوتينين كلوريد، وهي مادة تنتمي لمجموعتين من الأدوية الأولى تعرف بمضادات الكولين، و الثانية هي مضادات التقلصات.
* كيف يعمل مستحضر ديترونيين أقراص؟
يعمل الدواء عن طريق إرخاء عضلات المثانة و يوقف الانقباضات المفاجئة بالعضلة (التقلصات)، مما يساعد في السيطرة على التبول.
* فيم يستخدم مستحضر ديترونيين أقراص؟
يمكن أن يستخدم مستحضر ديترونيين أقراص للبالغين و الأطفال أكبر من ٥ سنوات، و ذلك لعلاج :
- فقدان التحكم في التبول (سلس البول).
- زيادة الحاجة الى التبول.
- عندما تعجز الأدوية الأخرى عن علاج التبول أثناء النوم.

٢- قبل تناول مستحضر ديترونيين أقراص

* لا تتناول مستحضر ديترونيين أقراص :
- ان كنت تعاني من تفاعلات الحساسية (فرط الحساسية) لمادة أوكسيبيوتينين كلوريد أو أي من مكونات ديترونيين أقراص الأخرى.
علامات الحساسية المفرطة تتضمن: الطفح الجلدي، أو صعوبة البلع أو التنفس أو تورم الشفاه أو الوجه أو الحلق أو اللسان.
- ان كنت تعاني من مرض ارتخاء العضلات اللاارادي (مرض نادر يصيب العضلات).
- ان كنت تعاني من الجلوكوما (زيادة ضغط العين وأحياناً ألم وزغللة مفاجئة في الرؤية أو فقدان البصر).
- اذا كانت المعدة و الأمعاء بها انسداد أو ثقب أو لا تعمل بشكل جيد.
- في حالات الإصابة بالتهاب القولون التقرحي الشديد.
- ان كان هناك انسداد ما يسبب صعوبة في التبول.
لو أن أي مما سبق ينطبق عليك، فلا تتناول الدواء و عليك الرجوع الى الطبيب المعالج ان لم تكن متأكداً.
* يجب الحرس و الرجوع للطبيب أو الصيدلي عند تناول مستحضر ديترونيين أقراص في الحالات الآتية:
- ان كنت تعاني من مشاكل بالكلية أو الكبد.
- ان كان السن يزيد عن ٦٥ سنة.
- ان كان المريض طفلاً (لا ينصح بتناول هذا الدواء لمن هم دون الخامسة).
- ان كنت تعاني من مرض متعلق بالأعصاب (يطلق عليه اعتلال الأعصاب التلقائي).
- ان كانت الغدة الدرقية أكثر نشاطاً من المعتاد (فرط التدرق).

الإدارة و المصنع : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك ١٦ قطعة رقم (١)



تليفون : ٤٥٩٨٣٦٧ / ٤٦٢٢٢٠٢ / ٣ / ٤ / ٥ / ٦ / ٧ / ٨ / ٩ (٠٣) فاكس : ٤٥٩٨٣٦٧ (٠٣)
Administration & Factory : New Borg El-Arab City - Third Industrial Zone - Block 16 - Part (1)
ص.ب : ٤٩ - برج العرب الجديدة - س.ت. رقم : ١٣٤٣٠٠ - إسكندرية - ب.ض : ٢٠٢-٤٦٤-٦٣٦ مركز كبار المولين
مكتب القاهرة : ٤ (ي) تقسيم أسماء فهمى - أرض الجولف - مدينة نصر - عمارة فارما بلازا - شقة ٢١ / ٢٢
تليفون : ٢٤١٥٥٨٩٣ - ٢٦٩٠٧٣٩٤ / ٥ / ٦ / ٧ (٠٢) فاكس : ٢٤١٥٥٩٦١ (٠٢)

الفرعونية للأدوية

فارو فارما

ش.م.م منشأة طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢٥٠ مليون جنيه مصرى

رأس المال المصدر ١٠٠ مليون جنيه مصرى



www.pharoniapharma.com

- ان كنت تعاني من أمراض القلب أو ضغط الدم المرتفع.
- ان كنت تعاني من اضطراب ضربات القلب (الخفقان) أو ضربات قلب سريعة و قوية.
- ان كنت تعاني من تضخم البروستاتا.
- ان كنت تعاني من عسر الهضم أو حرقة المعدة، و التي يسببها الفتأ الفجوي (حيث يندفع جزء من المعدة ويضغط خلال الحجاب الحاجز).
- ان كانت درجة حرارة الجسم مرتفعة (الحمى).
- ان كان المريض يعيش في مناخ حار.
- قد يقلل الديترونيين من كمية اللعاب الناتجة في اماكن تسوس الاسنان أو عدوى الفطريات للفم.

قد يسبب الديترونيين الجلوكوما (ارتفاع ضغط العين). الرجاء الرجوع للطبيب فوراً في حالة المعاناة من زغللة الرؤية، فقدان البصر أو أي ألم بالعين. **لا تأخذ الدواء مع أدوية أخرى** ان لم يكن المريض متأكداً أن أي مما سبق ينطبق عليه فيجب الرجوع للطبيب أو الصيدلي قبل تناول الدواء.

*** عند تناول أدوية أخرى** يجب ابلاغ الطبيب ان كنت تناولت أو تتناول أي أدوية أخرى، و يتضمن ذلك الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية، بما في ذلك الأعشاب الطبية. ذلك لأن ديترونيين أقراص يمكن أن يؤثر على طريقة عمل الأدوية الأخرى، و بالمثل قد تؤثر هذه الأدوية على عمل مستحضر ديترونيين أقراص.

و تحديداً يجب ابلاغ الطبيب ان كنت تتناول أي من الأدوية التالية:

- الأدوية الأخرى المغلفة لمستقبلات الكولين أو الأدوية المضادة للمسكارين، مثل بعض الأدوية التي تستخدم لعلاج حالات القولون العصبي أو الربو أو سلس البول أو الأدوية التي تعالج الدوار الحركي أو اضطراب الحركة المرتبط بمتلازمة باركينسون.
- الأدوية التي تساعد على النعاس (المهدئات) أو لو كنت مصاباً بالغثيان أو لو كنت مصاباً بالدوار مثل أدوية: بروكلوبرازين، أو كلوربرومازين.

- الأدوية التي تستخدم لعلاج حالات الأمراض العقلية (مثل كلوزابين، فينوثيازين، هالوبيريدول أو بنبريدول/مجموعة بيبوتيروفينون).

- أدوية الاكتئاب (مثل: أميتريبتالين، أمبيرامين أو دوسوليبين/ مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة).
- أمانتادين- و هو عقار يستخدم لعلاج حالات الشلل الرعاش و كذلك لعلاج والوقاية من بعض الفيروسات.
- ال-دوبا و الذي يستخدم لعلاج الشلل الرعاش.
- ديجوكسين و الذي يستخدم لعلاج مشاكل القلب.
- أدوية لعلاج مشاكل متعلقة بالمعدة و القولون مثل دومبريدون، ميتوكلوبروميد و بيثانيكول.

*** الحمل، الرضاعة و الخصوبة:**

يجب التحدث الى طبيبك قبل تناول هذا الدواء:

- في حالات الحمل أو عند احتمال حدوث الحمل أو الرغبة في ذلك.
- إذا كنت ترضعين طفلك أو تخططين للارضاع، ذلك لأن كمية صغيرة قد تفرز في حليب الأم، لذلك لا ينصح بتناول أوكسيبوتازين أثناء الرضاعة.

يجب سؤال الطبيب أو الصيدلي عن النصيحة قبل تناول الدواء اذا كنت حامل أو ترضعين طفلك.

*** القيادة و تشغيل الماكينات**

لو شعر المريض بالخمول أو عدم وضوح الرؤية اثناء تناول الدواء فيجب تجنب قيادة السيارات أو تشغيل الآلات و الماكينات.

*** معلومات هامة عن بعض مكونات القرص**

يحتوى القرص على سكر اللاكتوز، بعض المرضى لايمكنهم تحمل أو هضم بعض أنواع السكر وفى هذه الحالة ينصح بعد تناول ديترونيين أقراص. اذا لم يكن المريض متأكداً فعليه الرجوع للطبيب أو الصيدلي.

الإدارة و المصنع : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك ١٦ قطعة رقم (١)

تليفون : ٥٩٨٣٦٧ / ٤٦٢٢٢٠٢ / ٣ / ٤ / ٥ / ٦ / ٧ / ٨ (٠٣)

Administration & Factory : New Borg El-Arab City - Third Industrial Zone - Block 16 - Part (1)

ص.ب : ٤٩ برج العرب الجديدة - س.ت.رقم : ١٣٤٣٠٠ - إسكندرية - ب.ض : ٢٢-٤٦٤-٦٣٦ مركز كبار المولين

مكتب القاهرة : ٤ (ى) تقسيم أسماء فهمى - أرض الجولف - مدينة نصر - عمارة فارما بلازا - شقة ٢١ / ٢٢



الفرعونية للأدوية

فاروفارما

ش.م.م منشأة طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢٥٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر ١٠٠ مليون جنيه مصري



www.pharoniapharma.com

٣- كيفية تناول مستحضر ديترونيين أقراص

يجب تناول الدواء كما وصفه الطبيب، و يجب الرجوع للطبيب أو الصيدلي ان لم تكن متأكداً.
عند تناول الدواء:

- ديترونيين أقراص مستحضر يؤخذ بالفم.
- ينصح بتناول كمية كافية من الماء بعد ابتلاع الدواء.
- لا يوصف هذا الدواء للأطفال أقل من ٥ سنوات.
- اذا شعر المريض أن الجرعة لا تناسبه - لها تأثير ضعيف أو تأثير أقوى من اللازم -- فعليه الرجوع للطبيب دون أن يتدخل لتغيير الجرعة.
- الجرعة التي توصف من المستحضر:
- يقوم الطبيب بتقرير الجرعة المناسبة.
- البالغين:

- الجرعة المعتادة هي ٥ مجم مرتين أو ثلاثة مرات يوميا.
- قد يقرر الطبيب زيادة الجرعة الى ٥ مجم أربعة مرات يوميا، و هي الجرعة القصوى التي يمكن أن توصف.

كبار السن:

- الجرعة المعتادة هي ٢,٥ مجم مرتين يوميا.
- قد يقرر الطبيب زيادة الجرعة الى ٥ مجم مرتين يوميا.

الأطفال (أكبر من ٥ سنوات):

- الجرعة المعتادة هي ٢,٥ مجم مرتين يوميا.
- قد يقرر الطبيب زيادة الجرعة الى ٥ مجم مرتين أو ثلاث مرات يوميا.
- اذا كان الدواء يعطى لطفل لمنع التبول ليلاً أثناء النوم فيفضل أن تعطى آخر جرعة للطفل قبل النوم مباشرة.

* اذا تناولت كمية من الديترونيين أقراص أكبر من الموصوفة لك:

عند الافراط في تناول الدواء، يجب الرجوع للطبيب أو التوجه للمستشفى (قسم الاصابات)، و يفضل أن يصطحب المريض علبة الدواء معه أو ما تبقى منها حيث يجب أن يراها الطبيب المعالج.
ان تناول كمية كبيرة من الدواء - أكبر من الموصوفة للمريض - قد يكون خطيراً، وقد يصاب المريض بالقلق، قلة الراحة، تورد الوجه، الاصابة بالدوار أو الدوخة، اسراع ضربات القلب و التي قد تصبح غير منتظمة أو قوية، و قد يصاب المريض بمشاكل في التنفس أو تقيؤ أو قد تتطور الى غيبوبة.

* اذا نسيت تناول جرعتك من ديترونيين أقراص

عند نسيان الجرعة أو اذا تأخر المريض عن ميعاد تناول الجرعة، فيجب تناولها بمجرد تذكرها. على كل حال ان كان موعد الجرعة التالية قد حان فيجب تجاهل الجرعة المنسية، و لا يجب ان يضاعف المريض الجرعة للتعويض عن الجرعة المنسية.

* عند التوقف عن تناول ديترونيين أقراص

يستمر المريض في تناول ديترونيين أقراص كما وصفه الطبيب و حتى يقرر الطبيب له أن يتوقف عن تناول الدواء، و لا يجب ان يتوقف المريض عن تناول الدواء بمجرد شعوره بالتحسن.

٤- الأعراض الجانبية المحتملة

مثل كل الأدوية قد يسبب ديترونيين أقراص بعض الأعراض الجانبية، بالرغم من أنها لا تصيب كل من يعالج بهذا الدواء. الأطفال هم أكثر عرضة للاصابة بالأعراض الجانبية.

يجب أن يتوقف المريض عن تناول ديترونيين أقراص و الرجوع للطبيب أو المستشفى اذا حدث أي مما يلي:

٥/٣

الإدارة و المصنع : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك ١٦ قطعة رقم (١)

تليفون : ٤٩٠٧٣٩٤ / ٥ / ٦ / ٧ / ٨ / ٩ / ١٠ / ١١ / ١٢ / ١٣ / ١٤ / ١٥ / ١٦ / ١٧ / ١٨ / ١٩ / ٢٠ / ٢١ / ٢٢ / ٢٣ / ٢٤ / ٢٥ / ٢٦ / ٢٧ / ٢٨ / ٢٩ / ٣٠ / ٣١ / ٣٢ / ٣٣ / ٣٤ / ٣٥ / ٣٦ / ٣٧ / ٣٨ / ٣٩ / ٤٠ / ٤١ / ٤٢ / ٤٣ / ٤٤ / ٤٥ / ٤٦ / ٤٧ / ٤٨ / ٤٩ / ٥٠ / ٥١ / ٥٢ / ٥٣ / ٥٤ / ٥٥ / ٥٦ / ٥٧ / ٥٨ / ٥٩ / ٦٠ / ٦١ / ٦٢ / ٦٣ / ٦٤ / ٦٥ / ٦٦ / ٦٧ / ٦٨ / ٦٩ / ٧٠ / ٧١ / ٧٢ / ٧٣ / ٧٤ / ٧٥ / ٧٦ / ٧٧ / ٧٨ / ٧٩ / ٨٠ / ٨١ / ٨٢ / ٨٣ / ٨٤ / ٨٥ / ٨٦ / ٨٧ / ٨٨ / ٨٩ / ٩٠ / ٩١ / ٩٢ / ٩٣ / ٩٤ / ٩٥ / ٩٦ / ٩٧ / ٩٨ / ٩٩ / ١٠٠ / ١٠١ / ١٠٢ / ١٠٣ / ١٠٤ / ١٠٥ / ١٠٦ / ١٠٧ / ١٠٨ / ١٠٩ / ١١٠ / ١١١ / ١١٢ / ١١٣ / ١١٤ / ١١٥ / ١١٦ / ١١٧ / ١١٨ / ١١٩ / ١٢٠ / ١٢١ / ١٢٢ / ١٢٣ / ١٢٤ / ١٢٥ / ١٢٦ / ١٢٧ / ١٢٨ / ١٢٩ / ١٣٠ / ١٣١ / ١٣٢ / ١٣٣ / ١٣٤ / ١٣٥ / ١٣٦ / ١٣٧ / ١٣٨ / ١٣٩ / ١٤٠ / ١٤١ / ١٤٢ / ١٤٣ / ١٤٤ / ١٤٥ / ١٤٦ / ١٤٧ / ١٤٨ / ١٤٩ / ١٥٠ / ١٥١ / ١٥٢ / ١٥٣ / ١٥٤ / ١٥٥ / ١٥٦ / ١٥٧ / ١٥٨ / ١٥٩ / ١٦٠ / ١٦١ / ١٦٢ / ١٦٣ / ١٦٤ / ١٦٥ / ١٦٦ / ١٦٧ / ١٦٨ / ١٦٩ / ١٧٠ / ١٧١ / ١٧٢ / ١٧٣ / ١٧٤ / ١٧٥ / ١٧٦ / ١٧٧ / ١٧٨ / ١٧٩ / ١٨٠ / ١٨١ / ١٨٢ / ١٨٣ / ١٨٤ / ١٨٥ / ١٨٦ / ١٨٧ / ١٨٨ / ١٨٩ / ١٩٠ / ١٩١ / ١٩٢ / ١٩٣ / ١٩٤ / ١٩٥ / ١٩٦ / ١٩٧ / ١٩٨ / ١٩٩ / ٢٠٠ / ٢٠١ / ٢٠٢ / ٢٠٣ / ٢٠٤ / ٢٠٥ / ٢٠٦ / ٢٠٧ / ٢٠٨ / ٢٠٩ / ٢١٠ / ٢١١ / ٢١٢ / ٢١٣ / ٢١٤ / ٢١٥ / ٢١٦ / ٢١٧ / ٢١٨ / ٢١٩ / ٢٢٠ / ٢٢١ / ٢٢٢ / ٢٢٣ / ٢٢٤ / ٢٢٥ / ٢٢٦ / ٢٢٧ / ٢٢٨ / ٢٢٩ / ٢٣٠ / ٢٣١ / ٢٣٢ / ٢٣٣ / ٢٣٤ / ٢٣٥ / ٢٣٦ / ٢٣٧ / ٢٣٨ / ٢٣٩ / ٢٤٠ / ٢٤١ / ٢٤٢ / ٢٤٣ / ٢٤٤ / ٢٤٥ / ٢٤٦ / ٢٤٧ / ٢٤٨ / ٢٤٩ / ٢٥٠ / ٢٥١ / ٢٥٢ / ٢٥٣ / ٢٥٤ / ٢٥٥ / ٢٥٦ / ٢٥٧ / ٢٥٨ / ٢٥٩ / ٢٦٠ / ٢٦١ / ٢٦٢ / ٢٦٣ / ٢٦٤ / ٢٦٥ / ٢٦٦ / ٢٦٧ / ٢٦٨ / ٢٦٩ / ٢٧٠ / ٢٧١ / ٢٧٢ / ٢٧٣ / ٢٧٤ / ٢٧٥ / ٢٧٦ / ٢٧٧ / ٢٧٨ / ٢٧٩ / ٢٨٠ / ٢٨١ / ٢٨٢ / ٢٨٣ / ٢٨٤ / ٢٨٥ / ٢٨٦ / ٢٨٧ / ٢٨٨ / ٢٨٩ / ٢٩٠ / ٢٩١ / ٢٩٢ / ٢٩٣ / ٢٩٤ / ٢٩٥ / ٢٩٦ / ٢٩٧ / ٢٩٨ / ٢٩٩ / ٣٠٠ / ٣٠١ / ٣٠٢ / ٣٠٣ / ٣٠٤ / ٣٠٥ / ٣٠٦ / ٣٠٧ / ٣٠٨ / ٣٠٩ / ٣١٠ / ٣١١ / ٣١٢ / ٣١٣ / ٣١٤ / ٣١٥ / ٣١٦ / ٣١٧ / ٣١٨ / ٣١٩ / ٣٢٠ / ٣٢١ / ٣٢٢ / ٣٢٣ / ٣٢٤ / ٣٢٥ / ٣٢٦ / ٣٢٧ / ٣٢٨ / ٣٢٩ / ٣٣٠ / ٣٣١ / ٣٣٢ / ٣٣٣ / ٣٣٤ / ٣٣٥ / ٣٣٦ / ٣٣٧ / ٣٣٨ / ٣٣٩ / ٣٤٠ / ٣٤١ / ٣٤٢ / ٣٤٣ / ٣٤٤ / ٣٤٥ / ٣٤٦ / ٣٤٧ / ٣٤٨ / ٣٤٩ / ٣٥٠ / ٣٥١ / ٣٥٢ / ٣٥٣ / ٣٥٤ / ٣٥٥ / ٣٥٦ / ٣٥٧ / ٣٥٨ / ٣٥٩ / ٣٦٠ / ٣٦١ / ٣٦٢ / ٣٦٣ / ٣٦٤ / ٣٦٥ / ٣٦٦ / ٣٦٧ / ٣٦٨ / ٣٦٩ / ٣٧٠ / ٣٧١ / ٣٧٢ / ٣٧٣ / ٣٧٤ / ٣٧٥ / ٣٧٦ / ٣٧٧ / ٣٧٨ / ٣٧٩ / ٣٨٠ / ٣٨١ / ٣٨٢ / ٣٨٣ / ٣٨٤ / ٣٨٥ / ٣٨٦ / ٣٨٧ / ٣٨٨ / ٣٨٩ / ٣٩٠ / ٣٩١ / ٣٩٢ / ٣٩٣ / ٣٩٤ / ٣٩٥ / ٣٩٦ / ٣٩٧ / ٣٩٨ / ٣٩٩ / ٤٠٠ / ٤٠١ / ٤٠٢ / ٤٠٣ / ٤٠٤ / ٤٠٥ / ٤٠٦ / ٤٠٧ / ٤٠٨ / ٤٠٩ / ٤١٠ / ٤١١ / ٤١٢ / ٤١٣ / ٤١٤ / ٤١٥ / ٤١٦ / ٤١٧ / ٤١٨ / ٤١٩ / ٤٢٠ / ٤٢١ / ٤٢٢ / ٤٢٣ / ٤٢٤ / ٤٢٥ / ٤٢٦ / ٤٢٧ / ٤٢٨ / ٤٢٩ / ٤٣٠ / ٤٣١ / ٤٣٢ / ٤٣٣ / ٤٣٤ / ٤٣٥ / ٤٣٦ / ٤٣٧ / ٤٣٨ / ٤٣٩ / ٤٤٠ / ٤٤١ / ٤٤٢ / ٤٤٣ / ٤٤٤ / ٤٤٥ / ٤٤٦ / ٤٤٧ / ٤٤٨ / ٤٤٩ / ٤٥٠ / ٤٥١ / ٤٥٢ / ٤٥٣ / ٤٥٤ / ٤٥٥ / ٤٥٦ / ٤٥٧ / ٤٥٨ / ٤٥٩ / ٤٦٠ / ٤٦١ / ٤٦٢ / ٤٦٣ / ٤٦٤ / ٤٦٥ / ٤٦٦ / ٤٦٧ / ٤٦٨ / ٤٦٩ / ٤٧٠ / ٤٧١ / ٤٧٢ / ٤٧٣ / ٤٧٤ / ٤٧٥ / ٤٧٦ / ٤٧٧ / ٤٧٨ / ٤٧٩ / ٤٨٠ / ٤٨١ / ٤٨٢ / ٤٨٣ / ٤٨٤ / ٤٨٥ / ٤٨٦ / ٤٨٧ / ٤٨٨ / ٤٨٩ / ٤٩٠ / ٤٩١ / ٤٩٢ / ٤٩٣ / ٤٩٤ / ٤٩٥ / ٤٩٦ / ٤٩٧ / ٤٩٨ / ٤٩٩ / ٥٠٠ / ٥٠١ / ٥٠٢ / ٥٠٣ / ٥٠٤ / ٥٠٥ / ٥٠٦ / ٥٠٧ / ٥٠٨ / ٥٠٩ / ٥١٠ / ٥١١ / ٥١٢ / ٥١٣ / ٥١٤ / ٥١٥ / ٥١٦ / ٥١٧ / ٥١٨ / ٥١٩ / ٥٢٠ / ٥٢١ / ٥٢٢ / ٥٢٣ / ٥٢٤ / ٥٢٥ / ٥٢٦ / ٥٢٧ / ٥٢٨ / ٥٢٩ / ٥٣٠ / ٥٣١ / ٥٣٢ / ٥٣٣ / ٥٣٤ / ٥٣٥ / ٥٣٦ / ٥٣٧ / ٥٣٨ / ٥٣٩ / ٥٤٠ / ٥٤١ / ٥٤٢ / ٥٤٣ / ٥٤٤ / ٥٤٥ / ٥٤٦ / ٥٤٧ / ٥٤٨ / ٥٤٩ / ٥٥٠ / ٥٥١ / ٥٥٢ / ٥٥٣ / ٥٥٤ / ٥٥٥ / ٥٥٦ / ٥٥٧ / ٥٥٨ / ٥٥٩ / ٥٦٠ / ٥٦١ / ٥٦٢ / ٥٦٣ / ٥٦٤ / ٥٦٥ / ٥٦٦ / ٥٦٧ / ٥٦٨ / ٥٦٩ / ٥٧٠ / ٥٧١ / ٥٧٢ / ٥٧٣ / ٥٧٤ / ٥٧٥ / ٥٧٦ / ٥٧٧ / ٥٧٨ / ٥٧٩ / ٥٨٠ / ٥٨١ / ٥٨٢ / ٥٨٣ / ٥٨٤ / ٥٨٥ / ٥٨٦ / ٥٨٧ / ٥٨٨ / ٥٨٩ / ٥٩٠ / ٥٩١ / ٥٩٢ / ٥٩٣ / ٥٩٤ / ٥٩٥ / ٥٩٦ / ٥٩٧ / ٥٩٨ / ٥٩٩ / ٦٠٠ / ٦٠١ / ٦٠٢ / ٦٠٣ / ٦٠٤ / ٦٠٥ / ٦٠٦ / ٦٠٧ / ٦٠٨ / ٦٠٩ / ٦١٠ / ٦١١ / ٦١٢ / ٦١٣ / ٦١٤ / ٦١٥ / ٦١٦ / ٦١٧ / ٦١٨ / ٦١٩ / ٦٢٠ / ٦٢١ / ٦٢٢ / ٦٢٣ / ٦٢٤ / ٦٢٥ / ٦٢٦ / ٦٢٧ / ٦٢٨ / ٦٢٩ / ٦٣٠ / ٦٣١ / ٦٣٢ / ٦٣٣ / ٦٣٤ / ٦٣٥ / ٦٣٦ / ٦٣٧ / ٦٣٨ / ٦٣٩ / ٦٤٠ / ٦٤١ / ٦٤٢ / ٦٤٣ / ٦٤٤ / ٦٤٥ / ٦٤٦ / ٦٤٧ / ٦٤٨ / ٦٤٩ / ٦٥٠ / ٦٥١ / ٦٥٢ / ٦٥٣ / ٦٥٤ / ٦٥٥ / ٦٥٦ / ٦٥٧ / ٦٥٨ / ٦٥٩ / ٦٦٠ / ٦٦١ / ٦٦٢ / ٦٦٣ / ٦٦٤ / ٦٦٥ / ٦٦٦ / ٦٦٧ / ٦٦٨ / ٦٦٩ / ٦٧٠ / ٦٧١ / ٦٧٢ / ٦٧٣ / ٦٧٤ / ٦٧٥ / ٦٧٦ / ٦٧٧ / ٦٧٨ / ٦٧٩ / ٦٨٠ / ٦٨١ / ٦٨٢ / ٦٨٣ / ٦٨٤ / ٦٨٥ / ٦٨٦ / ٦٨٧ / ٦٨٨ / ٦٨٩ / ٦٩٠ / ٦٩١ / ٦٩٢ / ٦٩٣ / ٦٩٤ / ٦٩٥ / ٦٩٦ / ٦٩٧ / ٦٩٨ / ٦٩٩ / ٧٠٠ / ٧٠١ / ٧٠٢ / ٧٠٣ / ٧٠٤ / ٧٠٥ / ٧٠٦ / ٧٠٧ / ٧٠٨ / ٧٠٩ / ٧١٠ / ٧١١ / ٧١٢ / ٧١٣ / ٧١٤ / ٧١٥ / ٧١٦ / ٧١٧ / ٧١٨ / ٧١٩ / ٧٢٠ / ٧٢١ / ٧٢٢ / ٧٢٣ / ٧٢٤ / ٧٢٥ / ٧٢٦ / ٧٢٧ / ٧٢٨ / ٧٢٩ / ٧٣٠ / ٧٣١ / ٧٣٢ / ٧٣٣ / ٧٣٤ / ٧٣٥ / ٧٣٦ / ٧٣٧ / ٧٣٨ / ٧٣٩ / ٧٤٠ / ٧٤١ / ٧٤٢ / ٧٤٣ / ٧٤٤ / ٧٤٥ / ٧٤٦ / ٧٤٧ / ٧٤٨ / ٧٤٩ / ٧٥٠ / ٧٥١ / ٧٥٢ / ٧٥٣ / ٧٥٤ / ٧٥٥ / ٧٥٦ / ٧٥٧ / ٧٥٨ / ٧٥٩ / ٧٦٠ / ٧٦١ / ٧٦٢ / ٧٦٣ / ٧٦٤ / ٧٦٥ / ٧٦٦ / ٧٦٧ / ٧٦٨ / ٧٦٩ / ٧٧٠ / ٧٧١ / ٧٧٢ / ٧٧٣ / ٧٧٤ / ٧٧٥ / ٧٧٦ / ٧٧٧ / ٧٧٨ / ٧٧٩ / ٧٨٠ / ٧٨١ / ٧٨٢ / ٧٨٣ / ٧٨٤ / ٧٨٥ / ٧٨٦ / ٧٨٧ / ٧٨٨ / ٧٨٩ / ٧٩٠ / ٧٩١ / ٧٩٢ / ٧٩٣ / ٧٩٤ / ٧٩٥ / ٧٩٦ / ٧٩٧ / ٧٩٨ / ٧٩٩ / ٨٠٠ / ٨٠١ / ٨٠٢ / ٨٠٣ / ٨٠٤ / ٨٠٥ / ٨٠٦ / ٨٠٧ / ٨٠٨ / ٨٠٩ / ٨١٠ / ٨١١ / ٨١٢ / ٨١٣ / ٨١٤ / ٨١٥ / ٨١٦ / ٨١٧ / ٨١٨ / ٨١٩ / ٨٢٠ / ٨٢١ / ٨٢٢ / ٨٢٣ / ٨٢٤ / ٨٢٥ / ٨٢٦ / ٨٢٧ / ٨٢٨ / ٨٢٩ / ٨٣٠ / ٨٣١ / ٨٣٢ / ٨٣٣ / ٨٣٤ / ٨٣٥ / ٨٣٦ / ٨٣٧ / ٨٣٨ / ٨٣٩ / ٨٤٠ / ٨٤١ / ٨٤٢ / ٨٤٣ / ٨٤٤ / ٨٤٥ / ٨٤٦ / ٨٤٧ / ٨٤٨ / ٨٤٩ / ٨٥٠ / ٨٥١ / ٨٥٢ / ٨٥٣ / ٨٥٤ / ٨٥٥ / ٨٥٦ / ٨٥٧ / ٨٥٨ / ٨٥٩ / ٨٦٠ / ٨٦١ / ٨٦٢ / ٨٦٣ / ٨٦٤ / ٨٦٥ / ٨٦٦ / ٨٦٧ / ٨٦٨ / ٨٦٩ / ٨٧٠ / ٨٧١ / ٨٧٢ / ٨٧٣ / ٨٧٤ / ٨٧٥ / ٨٧٦ / ٨٧٧ / ٨٧٨ / ٨٧٩ / ٨٨٠ / ٨٨١ / ٨٨٢ / ٨٨٣ / ٨٨٤ / ٨٨٥ / ٨٨٦ / ٨٨٧ / ٨٨٨ / ٨٨٩ / ٨٩٠ / ٨٩١ / ٨٩٢ / ٨٩٣ / ٨٩٤ / ٨٩٥ / ٨٩٦ / ٨٩٧ / ٨٩٨ / ٨٩٩ / ٩٠٠ / ٩٠١ / ٩٠٢ / ٩٠٣ / ٩٠٤ / ٩٠٥ / ٩٠٦ / ٩٠٧ / ٩٠٨ / ٩٠٩ / ٩١٠ / ٩١١ / ٩١٢ / ٩١٣ / ٩١٤ / ٩١٥ / ٩١٦ / ٩١٧ / ٩١٨ / ٩١٩ / ٩٢٠ / ٩٢١ / ٩٢٢ / ٩٢٣ / ٩٢٤ / ٩٢٥ / ٩٢٦ / ٩٢٧ / ٩٢٨ / ٩٢٩ / ٩٣٠ / ٩٣١ / ٩٣٢ / ٩٣٣ / ٩٣٤ / ٩٣٥ / ٩٣٦ / ٩٣٧ / ٩٣٨ / ٩٣٩ / ٩٤٠ / ٩٤١ / ٩٤٢ / ٩٤٣ / ٩٤٤ / ٩٤٥ / ٩٤٦ / ٩٤٧ / ٩٤٨ / ٩٤٩ / ٩٥٠ / ٩٥١ / ٩٥٢ / ٩٥٣ / ٩٥٤ / ٩٥٥ / ٩٥٦ / ٩٥٧ / ٩٥٨ / ٩٥٩ / ٩٦٠ / ٩٦١ / ٩٦٢ / ٩٦٣ / ٩٦٤ / ٩٦٥ / ٩٦٦ / ٩٦٧ / ٩٦٨ / ٩٦٩ / ٩٧٠ / ٩٧١ / ٩٧٢ / ٩٧٣ / ٩٧٤ / ٩٧٥ / ٩٧٦ / ٩٧٧ / ٩٧٨ / ٩٧٩ / ٩٨٠ / ٩٨١ / ٩٨٢ / ٩٨٣ / ٩٨٤ / ٩٨٥ / ٩٨٦ / ٩٨٧ / ٩٨٨ / ٩٨٩ / ٩٩٠ / ٩٩١ / ٩٩٢ / ٩٩٣ / ٩٩٤ / ٩٩٥ / ٩٩٦ / ٩٩٧ / ٩٩٨ / ٩٩٩ / ١٠٠٠ / ١٠٠١ / ١٠٠٢ / ١٠٠٣ / ١٠٠٤ / ١٠٠٥ / ١٠٠٦ / ١٠٠٧ / ١٠٠٨ / ١٠٠٩ / ١٠١٠ / ١٠١١ / ١٠١٢ / ١٠١٣ / ١٠١٤ / ١٠١٥ / ١٠١٦ / ١٠١٧ / ١٠١٨ / ١٠١٩ / ١٠٢٠ / ١٠٢١ / ١٠٢٢ / ١٠٢٣ / ١٠٢٤ / ١٠٢٥ / ١٠٢٦ / ١٠٢٧ / ١٠٢٨ / ١٠٢٩ / ١٠٣٠ / ١٠٣١ / ١٠٣٢ / ١٠٣٣ / ١٠٣٤ / ١٠٣٥ / ١٠٣٦ / ١٠٣٧ / ١٠٣٨ / ١٠٣٩ / ١٠٤٠ / ١٠٤١ / ١٠٤٢ / ١٠٤٣ / ١٠٤٤ / ١٠٤٥ / ١٠٤٦ / ١٠٤٧ / ١٠٤٨ / ١٠٤٩ / ١٠٥٠ / ١٠٥١ / ١٠٥٢ / ١٠٥٣ / ١٠٥٤ / ١٠٥٥ / ١٠٥٦ / ١٠٥٧ / ١٠٥٨ / ١٠٥٩ / ١٠٦٠ / ١٠٦١ / ١٠٦٢ / ١٠٦٣ / ١٠٦٤ / ١٠٦٥ / ١٠٦٦ / ١٠٦٧ / ١٠٦٨ / ١٠٦٩ / ١٠٧٠ / ١٠٧١ / ١٠٧٢ / ١٠٧٣ / ١٠٧٤ / ١٠٧٥ / ١٠٧٦ / ١٠٧٧ / ١٠٧٨ / ١٠٧٩ / ١٠٨٠ / ١٠٨١ / ١٠٨٢ / ١٠٨٣ / ١٠٨٤ / ١٠٨٥ / ١٠٨٦ / ١٠٨٧ / ١٠٨٨ / ١٠٨٩ / ١٠٩٠ / ١٠٩١ / ١٠٩٢ / ١٠٩٣ / ١٠٩٤ / ١٠٩٥ / ١٠٩٦ / ١٠٩٧ / ١٠٩٨ / ١٠٩٩ / ١١٠٠ / ١١٠١ / ١١٠٢ / ١١٠٣ / ١١٠٤ / ١١٠٥ / ١١٠٦ / ١١٠٧ / ١١٠٨ / ١١٠٩ / ١١١٠ / ١١١١ / ١١١٢ / ١١١٣ / ١١١٤ / ١١١٥ / ١١١٦ / ١١١٧ / ١١١٨ / ١١١٩ / ١١٢٠ / ١١٢١ / ١١٢٢ / ١١٢٣ / ١١٢٤ / ١١٢٥ / ١١٢٦ / ١١٢٧ / ١١٢٨ / ١١٢٩ / ١١٣٠ / ١١٣١ / ١١٣٢ / ١١٣٣ / ١١٣٤ / ١١٣٥ / ١١٣٦ / ١١٣٧ / ١١٣٨ / ١١٣٩ / ١١٤٠ / ١١٤١ / ١١٤٢ / ١١٤٣ / ١١٤٤ / ١١٤٥ / ١١٤٦ / ١١٤٧ / ١١٤٨ / ١١٤٩ / ١١٥٠ / ١١٥١ / ١١٥٢ / ١١٥٣ / ١١٥٤ / ١١٥٥ / ١١٥٦ / ١١٥٧ / ١١٥٨ / ١١٥٩ / ١١٦٠ / ١١٦١ / ١١٦٢ / ١١٦٣ / ١١٦٤ / ١١٦٥ / ١١٦٦ / ١١٦٧ / ١١٦٨ / ١١٦٩ / ١١٧٠ / ١١٧١ / ١١٧٢ / ١١٧٣ / ١١٧٤ / ١١٧٥ / ١١٧٦ / ١١٧٧ / ١١٧٨ / ١١٧٩ / ١١٨٠ / ١١٨١ / ١١٨٢ / ١١٨٣ / ١١٨٤ / ١١٨٥ / ١١٨٦ / ١١٨٧ / ١١٨٨ / ١١٨٩ / ١١٩٠ / ١١٩١ / ١١٩٢ / ١١٩٣ / ١١٩٤ / ١١٩٥ / ١١٩٦ / ١١٩٧ / ١١٩٨ / ١١٩٩ / ١٢٠٠ / ١٢٠١ / ١٢٠٢ / ١٢٠٣ / ١٢٠٤ / ١٢٠٥ / ١٢٠٦ / ١٢٠٧ / ١٢٠٨ / ١٢٠٩ / ١٢١٠ / ١٢١١ / ١٢١٢ / ١٢١٣ / ١٢١٤ / ١٢١٥ / ١٢١٦ / ١٢١٧ / ١٢١٨ / ١٢١٩ / ١٢٢٠ / ١٢٢١ / ١٢٢٢ / ١٢٢٣ / ١٢٢٤ / ١٢٢٥ / ١٢٢٦ / ١٢٢٧ / ١٢٢٨ / ١٢٢٩ / ١٢٣٠ / ١٢٣١ / ١٢٣٢ / ١٢٣٣ / ١٢٣٤ / ١٢٣٥ / ١٢٣٦ / ١٢٣٧ / ١٢٣٨ / ١٢٣٩ / ١٢٤٠ / ١٢٤١ / ١٢٤٢ / ١٢٤٣ / ١٢٤٤ / ١٢٤٥ / ١٢٤٦ / ١٢٤٧ / ١٢٤٨ / ١٢٤٩ / ١٢٥٠ / ١٢٥١ / ١٢٥٢ / ١٢٥٣ / ١٢٥٤ / ١٢٥٥ / ١٢٥٦ / ١٢٥٧ / ١٢٥٨ / ١٢٥٩ / ١٢٦٠ / ١٢٦١ / ١٢٦٢ / ١٢٦٣ / ١٢٦٤ / ١٢٦٥ / ١٢٦٦ / ١٢٦٧ / ١٢٦٨ / ١٢٦٩ / ١٢٧٠ / ١٢٧١ / ١٢٧٢ / ١٢٧٣ / ١٢٧٤ / ١٢٧٥ / ١٢٧٦ / ١٢٧٧ / ١٢٧٨ / ١٢٧٩ / ١٢٨٠ / ١٢٨١ / ١٢٨٢ / ١٢٨٣ / ١٢٨٤ / ١٢٨٥ / ١٢٨٦ / ١٢٨٧ / ١٢٨٨ / ١٢٨٩ / ١٢٩٠ / ١٢

الفرعونية للأدوية

فاروفارما

ش.م.م منشأة طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢٥٠ مليون جنيه مصرى
رأس المال المصدر ١٠٠ مليون جنيه مصرى



www.pharoniapharma.com

- اذا كنت مصابا بتفاعلات الحساسية و أعراضها تتضمن: الطفح الجلدي، صعوبة في البلع و التنفس، تورم الشفاه أو الوجه أو الحلق أو اللسان.
- اذا شعرت بقلّة التعرق و التي تسبب الحمى، و خاصة في البيئات الحارة.
- يجب ابلاغ الطبيب أو الصيدلي اذا أصيب المريض بأي من الأعراض الجانبية التالية، خاصة ان زادت حدة هذه الأعراض أو لو استمرت أكثر من عدة أيام:
- أعراض شائعة جدا: (تصيب أكثر من شخص في كل ١٠ أشخاص)
 - الامساك
 - الغثيان
 - جفاف الفم
 - جفاف بالجلد، طفح جلدي أو زيادة في حساسية الجلد للشمس
 - صداع
 - النعاس (شعور بالدوخة و الرغبة في النوم)
 - دوّار
 - زغللة بالعين
- أعراض شائعة: (تصيب شخص إلى ١٠ أشخاص في كل ١٠٠ شخص)
 - جفاف العين
 - الاسهال
 - الشعور بالمرض (القيء)
 - ارتباك
 - تورّد الوجنتين خاصة في الأطفال
- أعراض غير شائعة: (تصيب شخص إلى ١٠ أشخاص في كل ١٠٠٠ شخص)
 - ألم المعدة
 - فقدان الشهية
 - صعوبة في البلع
- أعراض تحدث بمعدلات غير معروفة:
 - زيادة ضغط العين و في بعض الاحيان ألم و زغللة بالعين أو انعدام الرؤية (جلوكوما)
 - عسر الهضم أو حرقة المعدة (ارتجاع الحمض المعدي)
 - عدوى الجهاز البولي
 - ضربة شمس
 - صعوبة في التبول
 - الاثارة
 - القلق زيادة الاعتماد على الدواء
 - الشعور بالشك الزائد و عدم الثقة بالآخرين
 - اضطرابات بالصحة العقلية
 - سماع أصوات أو رؤية اشياء غير موجوده (هلاوس)
 - نعاس
 - كوابيس
 - نوبات (تشنجات)
 - اكتئاب
 - زيادة و ضربات القلب (الخفقان)



الفرعونية للأدوية

فارو فارما

ش.م.م منشأة طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
رأس المال المرخص به ٢٥٠ مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر ١٠٠ مليون جنيه مصري



www.pharoniapharma.com

- اسراع و عدم انتظام ضربات القلب
- تمدد حدقة العين
- حكة، و طفح جلدي (ارتيكاريا)
- انعدام التعرق

- زيادة حساسية الجلد للشمس (حساسية للضوء)

يجب أن يرجع المريض للطبيب أو الصيدلي لو أن أي من الأعراض السابقة زادت حدته أو استمر لفترة أطول من بضعة أيام أو لو لاحظت أعراض جانبية أخرى لم تذكر في هذه النشرة.

٥ - كيفية حفظ الدواء

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

يحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠°م، في مكان جاف.

٦ - معلومات إضافية:

يحتوي كل قرص على المادة الفعالة : أوكسيبيوتين كلوريد ٥ مجم
و كذلك المواد الغير الفعالة التالية:

لاكتوز احادي المائية، نشا الذرة، كروسكر ميللوز صوديوم، كوللويدال سيليكون داي أوكسيد، ماغنسيوم ستيريت.

العبوة:

الأقراص: علبة كرتون بها شريط (شفاف من غير لون Aluminum/ PVC) يحتوي على ١٠ أقراص ومعها نشرة.

إنتاج:

الشركة الفرعونية للأدوية (فارو فارما)

مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك ١٦ - قطعة رقم (١) - الإسكندرية - ج.م.ع.



الإدارة و المصنع : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك ١٦ قطعة رقم (١)

تليفون : ٨ / ٧ / ٦ / ٥ / ٤ / ٣ / ٢٢٢٠٢ ٤٦٢٢٢٠٢ (٠٣) فاكس : ٤٥٩٨٣٦٧ (٠٣)

Administration & Factory : New Borg El-Arab City - Third Industrial Zone - Block 16 - Part (1)

ص.ب : ٤٩ - برج العرب الجديدة - س.ت. رقم : ١٣٤٣٠٠ - إسكندرية - ب.ض : ٦٣٦-٤٦٤-٢٠٢ مركز كبار المولين

مكتب القاهرة : ٤ (ي) تقسيم أسماء فهمى - أرض الجولف - مدينة نصر - عمارة فارما بلازا - شقة ٢١ / ٢٢

تليفون : ٥ / ٦ / ٥ / ٧٣٩٤ - ٢٦٩٠٧٣٩٤ - ٢٤١٥٥٨٩٣ (٠٢) فاكس : ٢٤١٥٥٩٦١ (٠٢)

